

**Karta ostrzegawcza dla pacjenta otrzymującego lek Ruxience we wskazaniach innych niż onkologiczne**

**Dlaczego pacjent otrzymuje Kartę?**

Lek ten może zwiększyć ryzyko rozwoju zakażeń. Ta karta zawiera ważne informacje:

- o których pacjent powinien wiedzieć przed leczeniem lekiem Ruxience
- jakie są objawy zakażenia
- co pacjent powinien zrobić w przypadku, gdy podejrzewa u siebie wystąpienie zakażenia.

Karta zawiera również nazwisko pacjenta i nazwisko lekarza oraz numer jego telefonu.

**Jak pacjent powinien postępować z otrzymaną Kartą?**

- Kartę należy mieć zawsze przy sobie – np. w portfelu czy portmonetce.
- Kartę należy pokazywać każdemu lekarzowi, pielęgniarce lub lekarzowi stomatologowi, nie tylko lekarzowi specjaliście prowadzącemu leczenie lekiem Ruxience.

Kartę należy nosić przy sobie przez 2 lata od czasu przyjęcia ostatniej dawki leku Ruxience, ponieważ działania niepożądane leku mogą wystąpić do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia.

**Kiedy pacjent nie powinien otrzymać leku Ruxience?**

Pacjent nie powinien być leczony lekiem Ruxience, jeśli występuje u niego czynne zakażenie lub ma poważne problemy z układem odpornościowym.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje lub wcześniej przyjmował leki wpływające na układ odpornościowy, w tym leki stosowane w chemioterapii.

**Jakie są objawy sugerujące wystąpienie zakażenia?**

Należy zwrócić uwagę na następujące objawy, mogące sugerować zakażenie:

- gorączka lub uporczywy kaszel
- utrata masy ciała
- ból bez urazu
- złe samopoczucie lub apatia.

**Jeśli pojawi się jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce. Należy także poinformować ich o otrzymywaniu leku Ruxience.**

**Co dodatkowo pacjent powinien wiedzieć?**

Lek Ruxience może rzadko powodować ciężkie zakażenie mózgu nazywane postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML), które może zakończyć się śmiercią.

- Do objawów PML należą:
  - zaburzenia świadomości, utrata pamięci lub kłopoty z myśleniem,
  - utrata równowagi lub zmiany w sposobie chodzenia czy mówienia,
  - spadek siły lub osłabienie jednej połowy ciała,
  - niewyraźne widzenie lub utrata wzroku.

Jeśli pojawi się jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce. Należy także poinformować ich o otrzymywaniu leku Ruxience.

**Gdzie pacjent może uzyskać więcej informacji?**

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z Ulotką dołączoną do opakowania.

**Informacje dotyczące rozpoczęcia leczenia i dane kontaktowe**

Data podania ostatniej dawki: \_\_\_\_\_

Data podania pierwszej dawki: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko pacjenta: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko lekarza: \_\_\_\_\_

Numer telefonu lekarza: \_\_\_\_\_

Należy pamiętać, żeby podczas wizyty u lekarza mieć przy sobie listę wszystkich innych przyjmowanych leków.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w tej Karcie należy o to zapytać lekarza lub pielęgniarkę.

